



CENTRO POLIDIAGNOSTICO  
DR. I BOSSA E MARSICO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

## PRESCRIZIONE CARDIO-TC

- **CODICE: 87411.001** – ANGIO TC DEL TORACE, SENZA E CON MDC COMPRESO CIRCOLO POLMONARE E AORTA
- **CODICE: 88902.001** – TC RICOSTRUZIONE 3D

### Indicazione Clinica all'esame: valutazione arterie coronariche

Indicazioni per la prenotazione: depilare bene il Torace per poter apporre in modo appropriato gli elettrodi per ECG. Portare esami cardiologici precedenti, in particolare ECG da sforzo, Scintigrafia Miocardica, ecocardiografia recente (max di un mese), eventuale pregressa coronarografia.

Indicazioni cliniche all'esame: sospetta patologia coronarica in persone con bassa/media probabilità pre-test di malattia coronarica ed esami precedenti discordanti (ad esempio, prova da sforzo negativa, scintigrafia positiva o dubbia o viceversa). L'esame è notevolmente accurato nella valutazione dei by-pass aorto-coronarici. L'esame è notevolmente NON accurato in persone con elevata probabilità pre-test di malattia, in particolare nei diabetici, e nella valutazione della pervietà degli stent.

N.B.: l'esame avrà una adeguata accuratezza diagnostica per la visualizzazione dell'albero arterioso coronarico soltanto in coloro che si presenteranno con una frequenza cardiaca massima di 55bpm; è necessario quindi rivolgersi nei giorni precedenti al medico Curante o al Cardiologo per poter gradualmente portare la frequenza cardiaca a 55bpm, seguendo quanto indicato dai Clinici.

Osservare il digiuno e portare tutti gli esami standard pre-contrastografici ed eseguire eventuale terapia desensibilizzante come per gli altri esami con mezzo di contrasto e.v.

Terapia desensibilizzante pre-mdc e.v. in caso di allergie avvenute anche una sola volta nel corso della vita: Cetirizina 10mg, Ranitidina 300mg, Metilprednisolone 16mg, mattina e sera iniziando 3gg prima dell'esame e da eseguire anche la mattina dell'esame (la mattina dell'esame assumere i farmaci a digiuno).

N.B.: prima dell'assunzione dei farmaci desensibilizzanti bisogna sottoporre la terapia al Curante per valutare una eventuale ipersensibilità agli stessi. I principi attivi di cui sopra, in particolare la Cetirizina e la Ranitidina, non sono richiesti per la loro funzione di protezione gastrica e quindi non devono essere sostituiti con inibitori di pompa protonica in quanto questi ultimi non hanno effetto sui recettori H1 e H2.

*Da riportare ad ogni controllo*

**DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE**

Via Cesare Battisti, 62 - Tel. e Fax 081.8824044 - Tel. 081.8812784  
80059 Torre del Greco (NA) - P. IVA 0130 1691 216 - C. F. 0368 7080 634

Provvisoriamente Accreditato

**CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA**

C.so Vittorio Emanuele, 149 - Tel. 081.3580152  
80059 Torre del Greco (NA)

Provvisoriamente Accreditato

[www.centrodoca.com](http://www.centrodoca.com)