



CENTRO POLIDIAGNOSTICO
DR. I BOSSA E MARSICO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

PRESCRIZIONE ANGIO-TC AORTA ADDOMINALE

- **CODICE: 88012.001** –TC DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO
- **CODICE: 88014.001** – ANGIO TC DELL'ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO
- **CODICE: 88902.001** – TC RICOSTRUZIONE 3D

Indicazione Clinica all'esame: valutazione aorta addominale ed accessi arteriosi pre-endoprotesi

N.B.: se si crede che il sospetto aneurisma possa essere suscettibile di trattamento con posizionamento di endoprotesi per via percutanea, l'interventista vascolare necessita anche di una valutazione degli accessi utilizzati per il trattamento percutaneo (arterie femorali); pertanto per una corretta valutazione pre-intervento, ai codici/prestazioni di cui sopra, bisogna aggiungere:

- **CODICE: 88387.003** – ANGIO TC FEMORE e ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE DX (SENZA e CON MDC)
- **CODICE: 88387.004** – ANGIO TC FEMORE e ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE SIN (SENZA e CON MDC)

Osservare il digiuno e portare tutti gli esami standard pre-contrastografici ed eseguire eventuale terapia desensibilizzante come per gli altri esami con mezzo di contrasto e.v.

N.B.: coloro che assumono ipoglicemizzanti a base di metformina, dopo consulto con il Curante/Diabetologo, devono sospendere l'assunzione degli stessi per 48 ore prima dall'iniezione del mezzo di contrasto iodato e per 48 ore dopo l'iniezione dello stesso per la rara incidenza di severa acidosi lattica post-contrasto. Il Curante/Diabetologo valuteranno la sostituzione, per il periodo indicato, dei farmaci a base di metformina con farmaci che svolgono una funzione simile.

Terapia desensibilizzante pre-mdc e.v. in caso di allergie avvenute anche una sola volta nel corso della vita: Cetirizina 10mg, Ranitidina 300mg, Metilprednisolone 16mg, mattina e sera iniziando 3gg prima dell'esame e da eseguire anche la mattina dell'esame (la mattina dell'esame assumere i farmaci a digiuno).

N.B.: prima dell'assunzione dei farmaci desensibilizzanti bisogna sottoporre la terapia al Curante per valutare una eventuale ipersensibilità agli stessi. I principi attivi di cui sopra, in particolare la Cetirizina e la Ranitidina, non sono richiesti per la loro funzione di protezione gastrica e quindi non devono essere sostituiti con inibitori di pompa protonica in quanto questi ultimi non hanno effetto sui recettori H1 e H2.

Da riportare ad ogni controllo

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE

Via Cesare Battisti, 62 - Tel. e Fax 081.8824044 - Tel. 081.8812784
80059 Torre del Greco (NA) - P. IVA 0130 1691 216 - C. F. 0368 7080 634

Provvisoriamente Accreditato

CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA

C.so Vittorio Emanuele, 149 - Tel. 081.3580152
80059 Torre del Greco (NA)

Provvisoriamente Accreditato

www.centrodoca.com